

ICD10

						1.
						2.
						3.

5.

--	--	--	--	--	--

6.

--	--	--	--	--	--

7.

--	--	--	--	--	--

8.

--	--	--	--	--	--

9.

Diagnostic de tumeur maligne:

Stade T Tx Tis T0 T1 T2 T3 T4

Stade N Nx N0 N1 N2 N3

Stade M Mx M0 M1

Stade L Lx L0 L1 (L=Lymphangite carcinomateuse)

Stade V Vx V0 V1 (V = thrombose veineuse carcinomateuse)

Stade Pn Pnx Pn0 Pn1

Type de résection chirurgicale

RX R0 R1 R2

Grade histologique

GX G1 G2 G3 G4

Nombre de ganglions lymphatiques

prélevés positifs

Réhospitalisation en raison d'une tumeur maligne:

- 1 avec métastases
- 2 avec récurrence locale / progression de la tumeur
- 3 avec métastases et récurrence locale
- 4 pas de métastase ni récurrence locale

Chimiothérapie néo-adjuvante
1 = oui, 0 = non

Radiothérapie néo-adjuvante
1 = oui, 0 = non

Thérapie néo-adjuvante reçue comme prévu:

- 1 = oui
- 2 = non: arrêt suite aux effets secondaires de la chimiothérapie
- 3 = non: arrêt suite aux effets secondaires de la radiothérapie
- 4 = non: arrêt suite au mauvais état général du patient
- 5 = non: arrêt suite à une autre raison

Visé par le chef de clinique:

Visé par le médecin assistant: